Algorithme
"Traitement curatif d'une chéloïde"

Chéloïde

Évaluation
- siège
- taille, extension
- signes fonctionnels (prurit, douleur, articulaires)
- demande (esthétique, fonctionnelle)
- terrain (âge, ATCD personnel et familiaux)
- cause

Cas particuliers
- Suppuration (préthoracique, zone pileuses) → Cyclines, Isotrétinoïne orale
- Lobe oreille → Chirurgie + clip

Cas graves, si :
- limitation articulaire
- retentissement esthétique majeur

→ **Réunion de Concertation Pluridisciplinaire**
(Chirurgien/Radiothérapeute /Dermatologue)

Chéloïdes "habituelles"
→ 3 options en 1ère ligne

Traitements "non invasifs" (≥ 6 mois)
- Corticoïde niveau I
- Silicone (au moins 12h/24h)
- Compression (24 mm Hg, au moins 12h/24h)

Infiltrations corticoïdes retard
- concentration : 5 à 40 mg/ml,
- quantité par injection : 40 à 120 mg,
- nombre de séances (1 par mois) : ≥ 3

Chirurgie + infiltration corticoïdes
(à commencer ≤1 mois après, nombre de séances 1 à 3)

Échec(s) 1ère(s) ligne(s) :
→ Traitements de 2nde ligne
Lasers, cryochirurgie, bléomycine, 5-FU

Groupe Thématique Peau Noire de la SFD